

Эмпиема — гнойное воспаление полостей тела или полых органов. Причины развития эмпием — как гнойные очаги в соседних органах (например, абсцесс лёгкого, эмпиема плевральной полости), так и нарушение оттока гноя при [гнойном воспалении](#) полых органов (жёлчного пузыря, червеобразного отростка, маточной трубы и т.д.). При этом нарушены местные защитные механизмы (постоянное обновление содержимого полых органов, поддержание внутриполостного давления, что определяет кровообращение в стенке полого органа, синтез и секреция защитных веществ, включая секреторные иммуноглобулины). При длительном течении гнойного воспаления происходит облитерация полых органов.

□ Гнойная рана — особая форма гнойного воспаления, возникающая вследствие нагноения травматической, в том числе хирургической раны или при вскрытии во внешнюю среду очага гнойного воспаления с образованием раневой поверхности. Различают первичное и вторичное нагноение в ране.

◇ Первичное нагноение возникает непосредственно после травмы и травматического отёка.

◇ Вторичное нагноение — рецидив гнойного воспаления.

Участие бактерий в нагноении — часть процесса биологического очищения раны. Другие особенности гнойной раны связаны с условиями её возникновения и течения.

◇ Осложнения гнойной раны: флегмона, гнойно-резорбтивная лихорадка, сепсис.

◇ Исход гнойной раны — её заживление вторичным натяжением с формированием рубца.

Интересные статьи:

- 1) [Клиническая картина гепатита](#)

- 2) [Лептоспироз , Сифилис, Туберкулез](#)

- 3) [Алкогольный гепатит](#)