

Годы

Всего

Пищевод

Желудок

Прямая кишка

Лёгкие

Молочная железа

Шейка матки

Гемобластозы

1995

279,1

5,6

35,5

12,5

44,7

48,0

15,1

12,3

1996

288,0

5,7

35,4

12,9

44,8

50,0

15,1

12,9

1997

294,7

5,6

35,0

13,3

44,9

52,0

15,2

12,9

1998

302,0

5,5

34,7

13,9

44,4

55,1

15,4

13,1

1999

303,3

5,4

33,5

14,3

44,3

57,6

15,8

13,3

2000

309,0

5,2

33,2

14,8

43,5

58,1

16,0

13,7

2001

313,9

5,2

32,7

15,0

43,2

59,2

16,0

13,8

2002

317,2

5,0

32,4

15,7

43,2

60,2

16,1

14,4

В последние годы эпидемиологическая ситуация заболеваемости и смертности от опухолей имеет следующие тенденции.

□ Рост заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний во всех странах мира: 50% погибших проживали в развитых странах. Онкологические заболевания многие годы уверенно занимают второе место в структуре причин смерти после сердечно-сосудистой патологии. Из-за тенденции к снижению смертности от сердечно-сосудистых причин опухоли имеют шанс стать лидером среди причин смерти в XXI в.

□ Рост заболеваемости наблюдают во всех возрастных группах, но наибольшее число пациентов составляют лица старше 50 лет.

□ Существуют половые различия по частоте и структуре заболеваемости опухолями.

Заболеваемость новообразованиями среди мужчин выше в 1,5 раза, чем среди женщин, а в старших возрастных группах — более чем в два раза. В структуре заболеваемости мужчин с 1981 г лидируют рак лёгкого, желудка и толстой кишки. Отмечают небольшую стабилизацию уровня заболеваемости раком лёгкого и значительный рост заболеваемости раком толстой кишки. В [структуре заболеваемости](#) женщин первые три места делят рак молочных желёз, матки и толстой кишки. В России ситуация несколько иная. У мужчин наиболее часты рак лёгкого, желудка, кожи, у женщин — рак молочных желёз, кожи, желудка.

□ Структура заболеваемости и смертности непостоянна из-за увеличения частоты одних опухолей и снижения заболеваемости других. Иногда снижение заболеваемости связано с эффективной профилактикой. Например, в США в связи с запретом курения в общественных местах, строгим контролем за выбросом канцерогенных веществ в атмосферу произошла стабилизация показателей заболеваемости раком лёгкого.

Интересные статьи:

- 1) [Патогенез врождённых пороков развития](#)

2) [Предраковые патологии](#)

3) [Гистогенез и Цитогенез опухолей](#)