

Выделяют следующие виды опухолей из эпителия.

□ По степени зрелости:

злокачественные (из покровного эпителия — плоскоклеточный и переходноклеточный рак, из железистого — аденокарцинома);

доброкачественные (из покровного эпителия — папилломы, из железистого — аденомы).

Аденомы слизистых оболочек, способные к эндофитному росту, называют плоскими аденомами. При экзофитном росте аденомы образуют полипы (аденоматозные полипы).


□ По гистогенезу:

опухоли из покровного эпителия (плоского и переходного — папилломы, плоскоклеточный и переходноклеточный рак);

опухоли из железистого эпителия (аденомы, аденоматозные полипы, аденокарциномы).

□ По уровню дифференцировки (для аденокарцином).

Папилломы развиваются на коже, слизистых оболочках мочевого пузыря, пищевода, влагалища, реже в бронхиальном дереве (органонеспецифические опухоли). Макроскопически папиллома имеет сосочковую поверхность и напоминает цветную капусту. Папилломы, растущие эндофитно, можно выявить только при микроскопическом исследовании (инвертированные папилломы). Характерны сосочковые разрастания [покровного эпителия](#), имеющие фиброваскулярный стержень. При этом сохранены все основные свойства плоского эпителия: базальная мембрана, полярность, стратификация и комплексность. В папилломах обнаруживают признаки тканевого атипизма: увеличение количества слоёв плоского эпителия, его разрастания в виде сосочков. В папилломах из плоского эпителия нередко находят выраженное ороговение, поэтому их называют также кератомами. Не исключена вирусная природа папиллом. Их малигнизация крайне редка. Однако папилломы гортани, мочевого пузыря и кожи считают опасными предраковыми заболеваниями.



Папиллома кожи



Интересные статьи из раздела:

- 1) [Опухоли костной ткани](#)

- 2) [Трофобластическая патология](#)

- 3) [Морфология опухолей из плазматических клеток](#)