

Опухоли мягких тканей относительно часты. Число случаев впервые выявленных доброкачественных опухолей мягких тканей — 3 млрд пациентов в год, а злокачественных — около 30 млн. Злокачественные опухоли мягких тканей составляют примерно 1% всех злокачественных опухолей человека. Гистологическая классификация [опухолей](#) мягких тканей объединяет более 50 их разновидностей и основана на общепринятых критериях. Выделяют следующие виды опухолей.

▣ По степени зрелости:

доброкачественные опухоли из производных мезенхимы (фиброма, липома и др.);

злокачественные опухоли (саркома).

▣ По гистогенезу и цитогенезу:

из жировой ткани (адипозоцита) — липома, липосаркома;

из фиброзной ткани (фибробласта и миофибробласта) — фиброма, фибросаркома;

из фиброгистиоцитарных элементов — гистиоцитома, плеоморфная саркома;

из гладкомышечной ткани — лейомиома, леймиосаркома;


из перицитов — перицитома;

из скелетных мышц — рабдомиома, рабдомиосаркома;

из сосудистой ткани — ангиома, ангиосаркома;

из хрящевой и остеоидной ткани — хондрома, саркома;

из примитивной мезенхимальной клетки — мезенхимомы, миксомы, гамартомы и их злокачественные аналоги.



Фиброма пищевода

9) ~~инт~~ интересные случаи полиморфизма распределения классификации болезней