

Новообразования паратестикулярной локализации — злокачественная мезотелиома, десмопластическая круглоклеточная опухоль, цистаденома, рак придатков яичек, меланотическая нейроэктодермальная опухоль и др. Эти опухоли встречаются довольно редко, самая распространённая — аденоматоидная опухоль.

Аденоматоидная опухоль

Доброкачественная односторонняя опухоль, составляющая около 60% новообразований придатков яичек.

Морфологически опухоль выглядит как округлый узел без чётких границ, диаметром 1–3 см, состоящий из мягкой или плотноватой блестящей ткани серо-жёлтого цвета, иногда распространяющийся на белочную оболочку и даже на [тестикулярную паренхиму](#). Микроскопически опухоль имеет солидно-железистое строение: участки тубулярного и железисто-кистозного строения чередуются с обширными полями опухолевой ткани. Клетки имеют различную форму и размер, их цитоплазма нередко интенсивно оксифильна, вакуолизирована. Строма склерозированна, местами с участками выраженного гиалиноза, содержит гладкомышечные волокна и фоликулоподобные лимфоидные инфильтраты. Граница опухоли с непоражённой паренхимой яичек может быть неровной.

Опухоли мошонки

Наиболее часто встречается плоскоклеточный рак. Морфологически этот рак аналогичен эпидермоидному раку других локализаций. К более редким опухолям мошонки относятся базально-клеточный рак, болезнь Педжета, злокачественные опухоли из придатков дермы и мягких тканей. Среди опухолеподобных заболеваний мошонки наиболее встречаются остроконечная кондилома, гамартомы и разнообразные кисты.

Интересные статьи:

- 1) [Цистицеркоз](#)
- 2) [Натуральная оспа](#)
- 3) [Ишемия мозга и инфекция](#)