

Для описания патологии кожи используют следующие термины.

▣ Первичные элементы (макроскопические образования).

◊ Макула (пятно) — мелкий (менее 10 мм в диаметре) плоская зона атипичной окраски; форма может быть различной.

◊ Эритема — гиперемизированное пятно такого же типа более 10 мм в диаметре.

◊ Папула (узелок) — плотное образование, возвышающееся над уровнем кожи, обычно менее 10 мм в диаметре.

◊ Бляшка — крупная папула (более 10 мм) или группа сливных папул. Многие кожные заболевания (псориаз, бородавки, кератозы, рак кожи) начинаются с появления папул.

◊ Нодус (узел) — пальпируемое плотное образование не менее 5–10 мм в диаметре, иногда возвышающееся над уровнем кожи. Подобную характеристику могут иметь кисты сальных желёз, узловатая эритема, различные новообразования. Узлы более крупного размера, не менее 20 мм, называют опухолями.

◊ Везикула (пузырёк) — образование с чёткими границами, возвышающееся над уровнем кожи, имеющее вид полости с серозным экссудатом.

◊ Булла (пузырь) имеет диаметр более 5 мм. Пузырьки или пузыри — проявления [аллергического контактного дерматита](#), солнечных ожогов, укусов насекомых, вирусных инфекций, герпетиформного дерматита, пемфигоида и многих других заболеваний.

◊ Пустула (гнойничок) — поверхностное образование, возвышающееся над уровнем кожи и содержащее гной. Пустулы характерны для угрей, импетиго, грибковых инфекций, пустулёзного псориаза; они могут возникать при вторичном инфицировании пузырьков и пузырей.

◊ Уртикария (волдырь) — возвышающееся над уровнем кожи быстро исчезающее образование, обусловленное ограниченным отёком. Волдыри могут быть проявлением аллергической реакции.

◊ Телеангиэктазия — расширение поверхностных кровеносных сосудов. Причина таких изменений часто неизвестна, они могут возникать при местном применении фторсодержащих препаратов, глюкокортикоидов, при заболеваниях печени, системной склеродермии, атаксии-телеангиэктазии и т.д.

▣ Вторичные элементы — высыпания, возникающие в результате естественного развития первичных элементов или при действии на них больного (например, расчёсывании).

◇ Чешуйки — отторгнутые тонкие пластинки ороговевшего эпителия. Образование чешуек наблюдают при псориазе, себорейном дерматите, различных хронических дерматитах.

◇ Корка — высохшие на коже серозный экссудат, кровь или гной.

◇ Эрозия — частичное или полное разрушение эпидермиса (при герпетических инфекциях, пузырчатке).

◇ Язва — фокус повреждения (отсутствия) эпидермиса и части дермы. Язвы могут возникать при травме, острых и хронических инфекциях, заболеваниях периферических сосудов, некрозе злокачественных новообразований.

◇ Экскориация (ссадина) — линейный или вдавленный участок кожи, покрытый коркой и возникший в результате расчёсывания, трения или сдираания.

◇ Лихенизация — утолщение и огрубение кожи с резко выраженным усилением её рисунка; типична для атопического дерматита и ограниченного нейродермита.

◇ Онихолизис — отслоение ногтевой пластинки от ногтевого ложа.

◇ Атрофия — истончение и сморщивание кожи. Наблюдают при старении, дискоидной красной волчанке, после ожогов, длительного местного применения глюкокортикоидов.

◇ Рубец — плотное образование, возникающее в результате замещения нормальных структур кожи волокнистой соединительной тканью после частичного разрушения дермы.

▣ Микроскопические изменения.

◇ Нарушения ороговения (кератинизации):

гиперкератоз — чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса;

паракератоз — вид ороговения, когда в роговом слое сохранены клетки с ядрами, а зернистый слой эпидермиса отсутствует;

дискератоз — патологическое ороговение отдельных клеток шиповатого слоя и отдельных клеток под ним.

◇ Акантоз — гиперплазия эпидермиса с удлинением межсосочковых выростов, выступающих (как бы растущих) в дерму.

◇ Акантолиз — утрата межклеточных связей в результате разрушения соединений между кератиноцитами.

◇ Папилломатоз — термин, обозначающий гиперплазию эпидермиса с образованием экзофитных сосочков или наличие множественных папиллом.

◇ Спонгиоз — межклеточный отёк.

◇ Экзоцитоз — в дерматологии означает инфильтрацию эпидермиса клетками [воспалительного инфильтрата](#) или элементами крови.

◇ Вакуолизация — образование вакуолей в клетках или рядом с ними, преимущественно в базальном слое эпидермиса.

◇ Лентигиоз — линейная пролиферация меланоцитов в пределах базального слоя эпидермиса.

□ Другие термины, важные для понимания патологии кожи.

◇ Дерматит — воспаление кожи, обусловленное непосредственным воздействием на неё патогенного фактора; термин может быть использован как общее название всех форм воспаления в коже.

◇ Дерматоз (синоним — болезни кожные) — общее название различных поражений кожи и её придатков.

◇ Ихтиоз — разновидность гиперкератоза с поражением обширных участков или всего кожного покрова.

◇ Ксероз — патологическая сухость кожи, обусловленная гипосекрецией сальных желёз.

◇ Лишай (lichen) — общее название дерматозов, их основное проявление — поверхностные шелушащиеся пятна или папулы.

◇ Панникулит — воспалительный процесс в подкожной жировой клетчатке.

◇ Почесуха (prurigo) — общее название дерматозов с зудящими высыпаниями на коже в виде папул, везикул или узелков.

◇ Экзема (греч. eczema — высыпание на коже) — нейроаллергический дерматоз с серозным воспалением сосочкового слоя дермы и появлением полиморфной зудящей сыпи.

Заболевания кожи включают нарушения пигментации и меланоцитарные опухоли,

опухолеподобные процессы и опухоли эпидермиса, дермы и придатков кожи, острые и хронические дерматиты (экземы), папулосквамозные и буллёзные нарушения, крапивницу и эритему, инфекционные и паразитарные заболевания. Поражения кожи наблюдаются при опухолях гемопозитической и лимфоидной тканей, заболеваниях соединительной ткани, васкулитах, иммунных нарушениях, инфекционных заболеваниях и т.д.

Интересные медицинские статьи:

- 1) [Некроз тканей при воспалении](#)

- 2) [Дисэритропоэтические анемии](#)

3) [Эндометриоз](#)