

Кардиомиопатии — заболевания сердца некоронарогенной природы, связанные с дистрофией миокарда. Клинически для кардиомиопатий характерны одышка при физической нагрузке, аритмии, тахикардия, головокружение, иногда обмороки, в [терминальной стадии](#)

болезни — хроническая сердечная недостаточность.

Выделяют первичные и вторичные кардиомиопатии.

□ Первичные (идиопатические) кардиомиопатии:

гипертрофическая (обструктивная);

дилатационная (застойная);

рестриктивная (эндомиокардиальный фиброз);

аритмогенная дисплазия правого желудочка (правожелудочковая кардиомиопатия, болезнь Фонтана).

□ Вторичные кардиомиопатии:

токсические (действие этанола, кобальта, кокаина, катехоламинов, уремии и др.);

инфекционные;

метаболические (алиментарные, тизауризмозы, амилоидоз, подагра, эндокринопатии и др.);

при системных заболеваниях (гранулематозный, или гигантоклеточный миокардит, гранулематоз Вегенера, саркоидоз);

наследственные нервно-мышечные.

Распространённость. Заболеваемость первичными кардиомиопатиями — 7–10 случаев на 100 тыс. населения. Распространённость вторичных кардиомиопатий связана с соответствующими первичными заболеваниями.

Интересные медицинские статьи:

- 1) [Инфекционные заболевания роговицы и конъюнктивы](#)
- 2) [Шок](#)
- 3) [Сепсис](#)