Выделяют следующие виды лимфангиом: простые (капиллярные), кавернозные и кистозные (гигромы).

□ Капиллярные и кавернозные лимфангиомы соответствуют таким же гемангиомам. Отличие — отсутствие крови, наличие в ткани опухоли лимфоцитов и лимфоидных фолликулов.

□ Кистозные лимфангиомы чаще бывают в области шеи и подмышечной впадины. Это многополостная кистозная опухоль размером до 15 см. На разрезе видна мягкая розовая губчатая ткань, пропитанная светлой жидкостью. Кистозные полости заполнены лимфой, в строме лимфоидные скопления, иногда включения жировой и гладкомышечной ткани.

Гломус-ангиома

Гломус-ангиома (опухоль *Барре–Массона*) — опухоль, исходящая из [артериовенозных анастомозов](#) гломусного типа в коже. Это нейромиоартериальные рецепторы, участвующие в терморегуляции. Бывают поражены преимущественно дистальные фаланги пальцев кистей и стоп, подногтевое пространство. Характерна боль, иногда вазомоторные нарушения. Опухоль синюшно-красного цвета, размером 0,3–1 см, содержит ветвящиеся сосудистые каналы, разделённые стромой, и скопления специализированных гломусных клеток. Последние внешне напоминают эпителиоидные, иногда гладкомышечные клетки.

Статьи по медицине:

1) [Стадии гипертензии](#)

2) [Смешанные формы аритмии](#)

3) [Идиопатические кардиомиопатии](#)