

Классификация рака лёгкого учитывает локализацию опухоли, характер роста, макроскопический вид, стадию процесса, гистогенез.

□ По локализации выделяют следующие виды рака:

прикорневой (центральный), исходящий из стволового, долевого и проксимальной части сегментарного бронха;

периферический — из бронхов меньшего калибра, бронхиол и, вероятно, альвеол;

смешанный (массивный).

□ По характеру роста:

экзофитный (эндобронхиальный);

эндобронхиальный (перибронхиальный).

□ Макроскопические виды рака лёгкого: бляшковидный, полипозный, эндобронхиальный, диффузный, узловатый, разветвлённый, узловато-разветвлённый, полостной, пневмониоподобный.

□ По гистогенезу (микроскопически) выделяют следующие виды рака лёгкого:

плоскоклеточный (варианты по [гистологическому строению](#) и уровню дифференцировки);

мелкоклеточный [классический (овсяноклеточный, лимфоцитоподобный, промежуточноклеточный) и комбинированный];


аденокарцинома [ацинарная, сосочковая, бронхиоло-альвеолярная карцинома, солидная с продукцией слизи];

крупноклеточный рак (гигантоклеточный, светлоклеточный);

железисто-плоскоклеточный рак;

карциноидная опухоль;

рак бронхиальных желёз (аденоидно-кистозный, мукоэпидермоидный и др.).



Аденокарцинома лёгкого



Интересные статьи:

- 1) [Осмотр пациента с асцитом](#)

- 2) [Морфологические изменения в печени при желтухе](#)

3) [Поджелудочная железа](#)