

Врождённые аномалии (пороки развития) орофациальной области по происхождению могут быть наследственными и обусловленными экзогенными причинами (радиация, лекарственные препараты, алиментарные факторы и др.). Пороки развития часто являются проявлением наследственных хромосомных заболеваний.

АНОМАЛИИ ЛИЦА, ЧЕЛЮСТЕЙ И ГУБ

Наиболее частые врождённые пороки (1 случай на 1000 родов) — лицевые расщелины. Они возникают на 7 нед внутриутробного развития. Выделяют боковую расщелину верхней губы, расщелину нёба, сквозную расщелину верхней губы и нёба. При этих пороках развития отмечают расстройства дыхания, сосания, глотания, частые аспирации пищевых масс, нарушения речи.



□ Боковая расщелина верхней губы (хейлосхизис, заячья губа). Наблюдают отсутствие одностороннего (реже двустороннего) сращения между боковым и средним отделами губы с формированием щели, идущей к носу.

□ Расщелина нёба (палатосхизис, волчья пасть). Характеризуют наличием щели в твёрдом и/или мягком нёбе — неполная и полная расщелина соответственно.

□ Сквозная расщелина верхней губы и нёба ([хейлогнатопалатосхизис](#)). Сочетание расщелины губы и нёба с одной или двух сторон.

В области лица, челюстей, губ встречаются и другие аномалии: прогнатизм, гипогнатизм, экзостозы, врождённые свищи нижней губы, гранулы Фордайса.

- Прогнатизм — увеличение нижней челюсти с выступанием её вперед. Может быть приобретённой патологией (при акромегалии).
- Гипогнатизм — недоразвитие нижней челюсти относительно верхней.
- Экзостоз — вырост на кости твёрдого нёба или челюсти.
- Врождённые свищи нижней губы. Наличие на красной кайме симметричных по отношению к средней линии губы свищевых ходов, сообщающихся с губными слюнными железами.
- Гранулы Фордайса — множественные мелкие желтоватые или [желтовато-белые узелки](#) на губах и слизистой оболочке щёк, представленные сальными железами без выводных протоков.



Интересные статьи:

- 1) [Пневмония](#)

- 2) [Осмотр пациента с асцитом](#)

- 3) [Неспецифический реактивный гепатит](#)