По тяжести гингивит может быть:
лёгким — поражение преимущественно межзубной десны;
средней тяжести — воспаление межзубной и маргинальной десны;
тяжёлым — вся десна, включая альвеолярную часть.
По выраженности разрастаний (при гипертрофическом гингивите).
<ul> <li>Лёгкая степень — десна покрывает коронку зуба не более чем на 1/3.</li> </ul>
<ul><li>Среднетяжёлая степень — до 1/2 части коронки.</li></ul>
□ Тяжёлая степень— более 1/2 поверхности зуба, вплоть до режущей или жевательной кромки зуба.
У больных отмечается кровоточивость (особенно при зондировании) болезненных воспалённых дёсен, плохой запах изо рта, чувство дискомфорта во рту. Гистологически

У больных отмечается кровоточивость (особенно при зондировании) болезненных воспалённых дёсен, плохой запах изо рта, чувство дискомфорта во рту. Гистологически — отёк, гиперемия, дистрофия эпителия, инфильтрация. При <u>язвенном гингивите</u> присоединяются участки некроза с чёткой демаркацией, гной, фибринозный налёт. Дно язвы может составлять собственная пластинка слизистой оболочки или надкостница. При попытке удаления фибрина усиливаются боли и кровотечение. Характерен регионарный лимфаденит. При отёчной форме гипертрофического гингивита — отёк

соединительнотканных элементов, сосочков десны, гиперемия, лимфоплазмоцитарная инфильтрация. При фиброзной — пролиферация фибробластов, разрастание коллагена, поэтому сосочки плотные, не кровоточат. Происходит резорбция кости межзубных перегородок.
Острый локальный гингивит обычно заканчивается полным выздоровлением. Хронический гингивит нередко переходит в пародонтит.
Медицинские статьи:
1) Опухоли щитовидной железы
2) <u>Патология шишковидной железы и apud - системы</u>

3) Клиническая картина гепатита