В последние годы постоянно отмечается растущая заболеваемость сифилисом.

Орофациальный сифилис. Первичный — твёрдый шанкр губы, языка, лимфаденит регионарный, полиаденит. Вторичный — сифилиды (розеолёзная, папулёзная, пустулёзная сыпь на коже, слизистых оболочках мягкого нёба, миндалин). Сифилитическая заеда. Третичный — бугорковый и гуммозный.

□ Бугорковый. Единичные или множественные до 1,5 см диаметром бугорки, быстро изъязвляющиеся и через несколько месяцев рубцующиеся.

□ Гуммозный. Солитарная гумма с округлой плотной язвой. Характерен интерстициальный глоссит (фибропластический, склерозирующий). Разрастание фиброзной ткани вплоть до сифилитического цирроза языка. Поздний врождённый — триада Хатчинсона (бочко- и отвёрткообразные зубы, кератит, глухота), сифилитический глоссит.

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА

При системной красной волчанке поражения кожи лица и [слизистой оболочки](#) полости рта отмечаются у 40% больных, что часто сочетается с сухим синдромом Шёгрена.

Люпус

-

хейлит

проявляется эритемой, гиперкератозом, атрофией красной каймы нижней губы.

Может сочетаться с кожными изменениями. Редко протекает в виде веррукозной формы с бородавчатыми разрастаниями на губе. **Люпус-стоматит** характеризуется эритемой, отёком, атрофией, язвами, гиперкератозом слизистой оболочки полости рта.

СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ

Другим системным заболеванием, часто приводящим к поражению слизистых оболочек рта и кожи лица является системная склеродермия, при которой возможно сужение рта за счёт склероза мышц, развитие стоматита, глоссита, пародонтоза.

Интересные статьи:

- 1) [Врожденный туберкулёз и токсоплазмоз](#)

2) [Атеросклероз](#)

3) [Псориатический и энтеропатический артрит](#)