

К наиболее распространенным аномалиям относят атрезию и стеноз кишечника, дивертикул Меккеля, болезнь Гиршпрунга.

Врожденная обструкция кишки — редкое и тяжелое состояние, может быть обнаружено в любом отделе кишечника. Дуоденальную атрезию (врожденное отсутствие отверстия или канала кишки) диагностируют чаще, атрезию подвздошной и тощей кишки — значительно реже, аналогичное поражение толстой кишки — крайне редко. Обструкция бывает полной (атрезия) и неполной (стеноз). Атрезия проявляется в форме диафрагмы, построенной из слизистой оболочки и не имеющей отверстия, или в форме шнуровидного сегмента кишки, соединяющего неизмененные проксимальный и дистальный отделы этой же кишки.

Стеноз менее распространен, чем атрезия, он имеет вид сегмента с суженным просветом или диафрагмы с узким отверстием. Эти дефекты, единичные или множественные расценивают как аномалии развития, связанные с сосудистыми [заболеваниями плода](#)

или телескопическими инвагинациями (внедрением одного отрезка кишки в просвет другого). Недостаточность прободения клоакальной диафрагмы приводит к анальной атрезии.

Дивертикул Меккеля (J.F. Meckel) — выпячивание стенки подвздошной кишки. Представляет собой остаток незаращенного пупочно-кишечного протока в форме небольшого мешочка или слепо заканчивающегося сегмента, содержащего все три оболочки стенки кишки. Основная характеристика заболевания **писана «правилом четырёх двоек»:**

- присутствует у 2% населения;
- расположен на 2 фута (30 см) проксимальнее илеоцекальной заслонки;
- в 2% случаев осложняется воспалением, клинически напоминающим аппендицит, кишечной непроходимостью или кишечным кровотечением;
- в 2% случаев расположен в эктопических пептических язвах подвздошной кишки.

Полезные статьи:

- 1) [Висцеральный сифилис](#)
- 2) [Гидроцефалия](#)
- 3) [Гиперпитуитаризм и соматотропная опухоль](#)