

**Геморрой** — проявление варикозного расширения вен анального и перианального сплетений (прямокишечных вен), болеют примерно 5% населения. Причина заболевания — повышенное давление в геморроидальных венах в течение продолжительного времени.

Наиболее частые предрасполагающие факторы: потуги при запорах и венозный стаз при беременности. Геморрой редко бывает у лиц моложе тридцати лет.

**По локализации выделяют:**

наружный геморрой — варикозное расширение вен нижнего [геморроидального сплетения](#) ,

геморроидальные узлы расположены ниже аноректальной линии;

внутренний геморрой — варикозное расширение вен верхнего геморроидального сплетения;

поражение обоих сплетений.

Микроскопически обнаруживают тонкостенные, резко расширенные вены в подслизистой основе прямой кишки, выступающие в просвет органа через слизистую оболочку.

Локализация узлов и их частое травмирование предрасполагают к тромбозу вен. Поэтому заметны тромбы на разных стадиях развития, в том числе канализованные.

**Осложнения геморроя:** образование тромбов, поверхностные изъязвления и трещины прямой кишки в области геморроидальных узлов, инфаркты кишки.

### Интересные статьи:

- 1) [Зависимость заболеваемости от состояния макроорганизма](#)
- 2) [Хроническое общее венозное полнокровие](#)
- 3) [Тканевая коагуляция](#)