

Алкогольный гепатит — острое заболевание печени, обусловленное алкогольной интоксикацией. Однако некоторые гепатологи настаивают на существовании хронического алкогольного гепатита как самостоятельной нозологической формы, предлагая считать изменения в печени результатом повторных атак острого гепатита после алкогольных эксцессов.

Этиология и патогенез. Алкогольный гепатит возникает после 3–5 лет систематического употребления алкоголя, но только у 35% больных алкоголизмом. Один из механизмов поражения печени — прямое цитопатическое действие ацетальдегида (основного метаболита этанола). Эта молекула связывается с гемоглобином, альбумином, тубулином, актином (основными белками цитоскелета гепатоцита), трансферрином, [коллагеном](#) I и II типов, цитохромом P450-2E1 с образованием стабильных соединений. Последние могут длительно сохраняться в ткани печени, несмотря на завершение метаболизма этанола.

Патологическая анатомия. Печень плотная, бледная, с красноватыми или окрашенными жёлчью участками, размер её обычный или несколько увеличен, на разрезе часто видны мелкие узелки и фиброз — начальные признаки цирроза.

Острый алкогольный гепатит. Характерны очаговые некрозы гепатоцитов, их жировая и баллонная дистрофия, внутриклеточные эозинофильные включения (цитокератиновые промежуточные филаменты, или алкогольный гиалин, или тельца Мэллори, описанные также при первичном билиарном циррозе, болезни Вильсона, хроническом холестазе, печёночноклеточных опухолях). Видна [лейкоцитарная инфильтрация](#)

вокруг погибающих гепатоцитов, особенно содержащих алкогольный гиалин, соединительная ткань вокруг центральных вен (перивенулярный фиброз), отдельных гепатоцитов (перичеселлюлярный фиброз) и в портальных трактах, признаки холестаза.

Хронический алкогольный гепатит чаще имеет минимальную активность или мягкое течение. Морфологическая картина такая же, как при остром гепатите, кроме того, нарастает перивенулярный и перичеселлюлярный фиброз, начинают формироваться portoцентральные септы.

Прогноз. В случае острого алкогольного гепатита в неизменённой печени при отмене алкоголя и адекватной терапии структура органа может восстановиться полностью или возникает фиброз стромы. При частых эпизодах острой алкогольной интоксикации заболевание прогрессирует в мелкоузловой цирроз печени (у 30% больных алкогольным гепатитом).

Алкогольный фиброз печени

Существование этой формы алкогольной болезни печени признают не все гепатологи. Однако при повторных алкогольных эксцессах до формирования цирроза в печени развивается фиброз своеобразной локализации: вокруг центральных вен (перивенулярный) и отдельных гепатоцитов (periцеллюлярный).



Интересные статьи:

- 1) [Гемофилия](#)

2) [Остеосаркома](#)

3) [Внезапная коронарная смерть](#)