

Пороки развития жёлчных протоков: атрезия, гипоплазия, расширение протока, дивертикулы, удвоение протоков, смещение их устья.

- Атрезия жёлчных протоков — отсутствие в них просвета, может быть вызвана [нарушением эмбриогенеза](#) жёлчных протоков на стадии реканализации. Может сопровождаться аплазией и атрезией жёлчного пузыря. Наиболее характерный признак — выраженная желтуха при ахоличном стуле.
- Гипоплазия жёлчных протоков — крайне редкое заболевание, когда жёлчные протоки представляют собой тонкие тяжи с узким просветом, не обеспечивающим эвакуацию жёлчи.
- Врождённое расширение общего жёлчного протока (кистозное расширение, киста) возникает из-за отсутствия мышечной оболочки стенки протока при его сужении или перегибе в дистальной части. Осложнения: перфорация стенки кисты с развитием жёлчного перитонита, образование свищей между протоками и полыми органами.
- Дивертикулы жёлчных протоков описаны в единичных случаях.
- Удвоение жёлчных протоков редко бывает истинным, чаще место соединения правого и левого печёночных протоков смещено дистально. Протоки могут самостоятельно впадать в двенадцатиперстную кишку или соединяться в нижней трети печёочно-двенадцатиперстной связки.

Интересные статьи:

- 1) [Бруцеллёз](#)
- 2) [Жёлтая лихорадка](#)
- 3) [Щитовидный зоб](#)