Классификация гломерулопатий

 По течению гломерулопатии делят на острые (длительность несколько недель), подострые, или медленно прогрессирующие (несколько недель или месяцев), хронические (годы).

 По распространённости:

очаговая гломерулопатия — в патологический процесс вовлечено менее 70% клубочков;

диффузная — поражено не менее 70% клубочков;

сегментарная — патологические изменения в отдельных капиллярных петлях и сегментах клубочка;

тотальная (диффузная) — патологические изменения на всей площади среза клубочка.

 По морфологическим проявлениям гломерулопатии (гломерулонефриты) классифицируют следующим образом:

диффузный пролиферативный (эндокапиллярный);

гломерулонефрит с полулуниями (экстракапиллярный пролиферативный);

очаговый пролиферативный;

мезангиопролиферативный;

мезангиокапиллярный (мембранозно-пролиферативный);

болезнь плотных депозитов (вариант мембранозно-пролиферативного гломерулонефрита);

диффузный/очаговый фибропластический (склерозирующий).

Развёрнутая классификация гломерулопатий

 Первичные гломерулопатии.

◊ Невоспалительные:

минимальные изменения клубочков (липоидный нефроз);

фокальный сегментарный гломерулярный склероз/гиалиноз;

мембранозная гломерулопатия (нефропатия);

наследственный нефрит (синдром Альпорта);

доброкачественная семейная гематурия (болезнь тонкой базальной мембраны).

◊ Воспалительные (гломерулонефрит).

- Острый постинфекционный (диффузный пролиферативный) гломерулонефрит.

- Мезангиокапиллярный (мембранозно-пролиферативный) гломерулонефрит:

тип 1 (гломерулонефрит с субэндотелиальными депозитами);

тип 2 (болезнь плотных депозитов);

тип 3 (гломерулонефрит с субэндотелиальными и субэпителиальными депозитами).

- Гломерулонефрит с полулуниями (экстракапиллярный пролиферативный, гломерулонефрит с антителами к гломерулярной базальной мембране).

 Вторичные гломерулопатии:

диабетический гломерулосклероз;

амилоидная нефропатия;

парапротеинемическая нефропатия (при множественной миеломе, макроглобулинемии Вальденстрёма, криоглобулинемии);

волчаночная нефропатия;

гломерулонефрит при бактериальном эндокардите;

гломерулонефрит при болезни Шёнляйна–Геноха.

Интересные статьи:

1) Мукоэпидермоидный и аденокистозный рак

2) Ишемическая болезнь кишечника

3) Гепаторенальный синдром