

МУКОРОМИКОЗ

Мукоромикоз — грибковое оппортунистическое заболевание, возникает при состояниях, сопровождающихся лейкопенией, а также у больных сахарным диабетом с кетоацидозом. Возбудители — грибы хлебной плесени, главным образом, рода *Mucor*. Пути заражения — воздушно-капельный или фекально-оральный. Входные ворота инфекции — пазухи носа и лёгкие, либо желудочно-кишечный тракт. У больных сахарным диабетом гифы грибов могут распространяться гематогенно в орбиты глаз и головной мозг, вызывая риноцеребральный мукоромикоз.

Он возникает, если мицелии гриба, вызывающие некроз тканей первичного очага, попадают в артериальный кровоток, а затем — в периорбитальные ткани и кости свода черепа. При этом развивается менингоэнцефалит. При обтурации грибами просветов артерий возникают инфаркты мозга. Таким же образом возможно развитие геморрагических инфарктов лёгких и периинфарктной пневмонии.

ОПОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ

Оппортунистическими называют инфекции, вызываемые условно-патогенными [микроорганизмами](#)

. Для них характерно тяжёлое рецидивирующее течение, склонность к генерализации, устойчивость к лечению.

Возбудители оппортунистических инфекций — простейшие (пневмоцисты, токсоплазмы, криптоспоридии), грибы (кандиды, криптококки). вирусы (цитомегаловирусы, вирусы

герпеса, медленных инфекций), бактерии (*M. avium*, *M. intracellulare*, легионеллы, сальмонеллы), энтеробактерии. При снижении резистентности организма они способны проникать в ткани и вызывать, в основном, гастроэнтериты, инфекции мочевыводящих путей, иногда септицемию. При прогрессирующем уменьшении числа CD4+ Т-лимфоцитов риск возникновения оппортунистических инфекций возрастает.

Полезные статьи:

- 1) [Инфекции плода и новорожденного](#)
- 2) [Злокачественные опухоли](#)

3) [Строение кожного покрова](#)