Наркомания — группа заболеваний, проявляющихся влечением к постоянному приёму лекарственных средств и наркотических веществ вследствие стойкой физической и психической зависимости от них. Лекарственные и нелекарственные наркотические средства определены списком наркотических веществ Минздрава РФ. Сейчас постоянно возникают новые синтетические наркотики, в основном, производимые в подпольных лабораториях.
Разновидностей наркомании очень много: опийная наркомания, вызываемая опиатами (морфинизм, кодеинизм, героинизм и т.д.), наркомания при употреблении препаратов конопли (гашишизм), наркомания, обусловленная приёмом эфедрина (эфедринизм), барбитуровая наркомания в результате постоянного употребления производных барбитуровой кислоты и т.д. Возможно пристрастие к одному наркотическому веществу — мононаркомания или к их сочетанию — полинаркомания.

При всех наркоманиях происходит быстрое привыкание к препарату с развитием физической и психической зависимости от него, а также абстинентного синдрома. При большинстве наркоманий зависимость развивается в течение 2–3 нед после начала приёма наркотического препарата, но существуют синтетические наркотики, формирующие зависимость после 2–3 инъекций. Все наркотические средства изменяют психическое состояние наркомана. Общие черты: благодушное настроение, возбуждение, снижение критики к своему поведению и поступкам, хотя поведение часто нелепо (беспричинный безудержный смех, болтливость, шаловливость). Нарушено восприятие пространства и времени. Ряд наркотиков вызывает оглушённость, зрительные, иногда слуховые галлюцинации, бредовые идеи, склонность к агрессии, что делает наркомана социально опасным. Возможны острые психозы продолжительностью 3–7 дней. Иногда, наоборот, бывают апатия, безразличие к окружающему. Общее для всех наркоманий — тяжёлый абстинентный синдром, возникающий через несколько часов, иногда через 1–2 сут после прекращения употребления наркотика.

Абстинентный синдром включает тревогу, беспокойство, резкие болевые ощущения во всём теле («ломка»), бессонницу, тошноту, рвоту, понос, повышение АД, спазмы в желудке, судороги, отсутствие аппетита, похудание. Такие острые проявления абстинентного синдрома могут сохраняться 8–10 дней, после чего начинают ослабевать.

У всех наркоманов развиваются различные заболевания внутренних органов. Больные выглядят старше своих лет, кожа дряблая, морщинистая, иногда желтушная или сероватая. Выпадают волосы и зубы, видны многочисленные рубцы от внутривенных инъекций. Больные обычно истощены. При длительном употреблении наркотиков нарастает деградация личности, наркоманы становятся эгоистичными, безразличными к окружающим, в том числе, к близким, снижаются интеллектуальные способности. У наркоманов эмоции грубеют, быстро наступает физическое и психическое истощение, утрата морально-этических принципов, они часто совершают антисоциальные поступки.

Наркоманы умирают, как правило, в молодом возрасте, обычно от передозировки наркотического вещества, иногда в состоянии абстиненции от сердечно-сосудистой

недостаточности. Они — основные носители и распространители ВИЧ-инфекции и составляют большинство умирающих от СПИДа.

Интересные статьи:

1) Паразитарный миокардит

2) Пороки сердца

3) Аномалии половых хромосом